

Newsletter



Sygnalizacja Agrofagów

NR 10/2025



Objawy żerowania


- Zasychanie plew i ziaren - mszyce zasiedlające kłosa powodują ich przedwczesne zasychanie.
- Niedorozwinięte ziarno - małe, pomarszczone, słabo wykształcone ziarna.
- Zanieczyszczenie spadzią - na kłosach spadź powoduje lepkość i sprzyja rozwojowi grzybów sadzakowych.

Szkodliwość

- Zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej - co obniża ogólną wydajność roślin.
- Obniżenie plonów - zmniejszenie masy tysiąca ziaren (MTZ) i ogólnej jakości plonu.
- Przenoszenie wirusów, m.in.: żółtej karłowatości jęczmienia.

1 Mszyca zbożowa

- Mszyce zimują w postaci jaj na trawach, resztkach poźniwnych, samosiewach i na oziminach.
- Wiosenne loty uskrzydłych osobników rozpoczynają się w drugiej połowie maja lub na przełomie maja i czerwca.
- Masowe występowanie mszyc na zbożach obserwuje się w warunkach ciepłej i suchej pogody. Mszyca zbożowa zasiedla głównie kłosa.



- Pod koniec dojrzałości mlecznej zbóż, uskrzydłone osobniki przelatują na kukurydzę i trawy. Późną jesienią po kopulacji z bezskrzydłymi samcami samice jajorodne składają jaja na zimowanie.

2 Sygnalizacja agrofagów

Aktualna sygnalizacja agrofagów w poszczególnych powiatach województwa pomorskiego ma na celu ułatwienie producentowi rolnemu skuteczne, racjonalne i ekonomiczne zarządzanie ochroną upraw przed agrofagami.

3 Przegląd aktualnych agrofagów

Przegląd aktualnych agrofagów w poszczególnych uprawach ma na celu: wczesne wykrycie zagrożeń, określenie progów szkodliwości, a przede wszystkim optymalizację terminów zabiegów.

**AKTUALNA SYGNALIZACJA WYSTĘPOWANIA AGROFAGÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 r.**

POWIAT	RODZAJ UPRAWY	AGROFAG	PRÓG SZKODLIWOŚCI *
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE			
bytowski	rzepak ozimy BBCH 80	chowacz podobnik	Termin zabiegu minął
	pszenica ozima BBCH 69	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza plew pszenicy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1% porażonej powierzchni liścia flagowego
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 5 sztuk na 1 roślinie
chojnicki	rzepak ozimy BBCH 80	chowacz podobnik	Termin zabiegu minął
		zgnilizna twardzikowa	Termin zabiegu minął
	żyto ozime BBCH 69	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
człuchowski	rzepak ozimy BBCH 80	chowacz podobnik	Termin zabiegu minął
		zgnilizna twardzikowa	Termin zabiegu minął
	pszenica ozima BBCH 69	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza plew pszenicy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1% porażonej powierzchni liścia flagowego
		mszyce	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 5 sztuk na 1 roślinie
gdański	rzepak ozimy BBCH 80	chowacz podobnik	Termin zabiegu minął
		zgnilizna twardzikowa	Termin zabiegu minął
	pszenica ozima BBCH 69	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza plew pszenicy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1% porażonej powierzchni liścia flagowego
		brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości

		mszyce	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 5 sztuk na 1 roślinie
kartuski	rzepak ozimy BBCH 80	chowacz podobnik	Termin zabiegu minął
		zgnilizna twardzikowa	Termin zabiegu minął
	pszenica ozima BBCH 69	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza plew pszenicy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1% porażonej powierzchni liścia flagowego
		mszyce	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 5 sztuk na 1 roślinie
	kukurydza BBCH 18	ploniarka zbożówka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyca	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
kościerski	pszenica ozima BBCH 69	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza plew pszenicy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1% porażonej powierzchni liścia flagowego
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 5 sztuk na 1 roślinie
	żyto ozime BBCH 71	septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyca	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	łubin BBCH 51	oprzędziki	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	groch BBCH 39	oprzędziki	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	ziemniaki BBCH 31	mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		stonka ziemniaczana	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		zaraza ziemniaka	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
kwidzyński	burak cukrowy BBCH 35	mszyca trzmielinowo-burakowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		śmietka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej

			szkodliwości
		chwościk	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 69	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza plew pszenicy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1% porażonej powierzchni liścia flagowego
		mszyce	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 5 sztuk na 1 roślinie
	kukurydza BBCH 18	ploniarka zbożówka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyca	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
lęborski	żyto ozime BBCH 71	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyca	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	ziemniaki BBCH 51	mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		stonka ziemniaczana	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 10 żółt jaj na 10 roślin lub 15 larw na 1 roślinę, lub 1-2 chrząszczy na 25 roślin
		zaraza ziemniaka	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	kukurydza BBCH 16	ploniarka zbożówka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
malborski	rzepak ozimy BBCH 80	chowacz podobnik	Termin zabiegu minął
		pryszczarek kapustnik	Termin zabiegu minął
	pszenica ozima BBCH 69	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - faza kłoseń - 5-10% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści z owocnikami
		septorioza plew pszenicy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1% porażonej powierzchni liścia flagowego
		rdza brunatna	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym lub flagowym
		mszyce	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości –

	groch BBCH 65		5 sztuk na 1 roślinie
		mszyce	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – pojedyncze mszyce na 20% roślin
		mączniak rzekomy grochu	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – pierwsze objawy porażenia
		askochytoza grochu	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	burak cukrowy BBCH 36	fuzaryjne więdnienie grochu	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyca trzmielinowo-burakowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		śmietki	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	kukurydza BBCH 18	chwościk	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		ploniarka zbożówka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	ziemniak BBCH 51	stonka ziemniaczana	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 10 złóż jaj na 10 roślin lub 15 larw na 1 roślinę, lub 1-2 chrząszczy na 25 roślin
		mszyca	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		zaraza ziemniaka	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
nowodworski	rzepak ozimy BBCH 80	chowacz podobnik	Termin zabiegu minął
		zgnilizna twardzikowa	Termin zabiegu minął
	groch BBCH 65	mszyce	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – pojedyncze mszyce na 20% roślin
		mączniak rzekomy grochu	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – pierwsze objawy porażenia
pucki	rzepak ozimy BBCH 80	chowacz podobnik	Termin zabiegu minął
		zgnilizna twardzikowa	Termin zabiegu minął
	pszenica ozima BBCH 69	septorioza plew pszenicy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1% porażonej powierzchni liścia flagowego
		mszyce	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 5 sztuk na 1 roślinie
słupski	rzepak ozimy BBCH 78	chowacz podobnik	Termin zabiegu minął
		zgnilizna twardzikowa	Termin zabiegu minął
	pszenica ozima BBCH 69	mączniak prawdziwy	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości

		septorioza plew pszenicy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1% porażonej powierzchni liścia flagowego
		brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 5 sztuk na 1 roślinie
	jęczmień ozimy BBCH 58	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		skrzypionki	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
starogardzki	kukurydza BBCH 17	ploniarka zbożówka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 73	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza plew pszenicy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1% porażonej powierzchni liścia flagowego
		mszyce	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 5 sztuk na 1 roślinie
	ziemniaki BBCH 23	mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		stonka ziemniaczana	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		zaraza ziemniaka	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
sztumski	rzepak ozimy BBCH 80	chowacz podobnik	Termin zabiegu minął
		zgnilizna twardzikowa	Termin zabiegu minął
	pszenica ozima BBCH 69	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza plew pszenicy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1% porażonej powierzchni liścia flagowego
		mszyce	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 5 sztuk na 1 roślinie
tczewski	rzepak ozimy BBCH 80	chowacz podobnik	Termin zabiegu minął
		zgnilizna twardzikowa	Termin zabiegu minął
	pszenica ozima BBCH 69	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza plew pszenicy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1% porażonej powierzchni liścia flagowego

		mszyce	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 5 sztuk na 1 roślinie
wejherowski	kukurydza BBCH 18	ploniarka zbożówka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	ziemniaki BBCH 51	mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		stonka ziemniaczana	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 10 żółt jaj na 10 roślin lub 15 larw na 1 roślinę, lub 1-2 chrząszczy na 25 roślin
		zaraza ziemniaka	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości

Uwaga!!! Decyzję o potrzebie wykonania zabiegu chemicznego podejmuje się indywidualnie dla każdej plantacji, po stwierdzeniu obecności agrofaga i przekroczeniu przez niego progu ekonomicznej szkodliwości.

Komunikat o występowaniu agrofagów służy jako sygnał wskazujący na konieczność dokładnego przeprowadzenia lustracji na plantacji.

Przegląd aktualnych agrofagów

Śmietki na buraku cukrowym

Próg szkodliwości - do fazy 8 liści - powyżej 20 jaj lub min na 1 roślinę.



Mszycy trzmielinowo burakowa

Próg szkodliwości - 15% zasiedlonych roślin lub średnio 15 mszyc nieuskrzydłych na jedną roślinę.

Mszyce na ziemniaku

Próg szkodliwości - plantacje nasienne - 5-10 mszyc/100 liści, plantacje produkcyjne - 10-20 mszyc/100 liści, szkodnik bezpośredni - 500 mszyc/100 liści.



Przegląd aktualnych agrofagów

Stonka ziemniaczana

Próg szkodliwości - 10 złoż jaj na 10 roślin lub 15 larw na 1 roślinę, lub 1-2 chrząszczy na 25 roślin



Septorioza plew pszenicy

Próg szkodliwości - w fazie kłoszenia - 5-10% liści z objawami porażenia.


Brunatna plamistość liści

Próg szkodliwości - w fazie strzelania w źdźbło - 5% liści z pierwszymi objawami porażenia.



Przegląd aktualnych agrofagów

Mączniak prawdziwy



Rdza brunatna

Próg szkodliwości - objawy na
liściu flagowym

Mszyca zbożowa

Próg szkodliwości - 5 mszyc na 1
kłosie



Przegląd aktualnych agrofagów

Mszyca grochowa

Próg szkodliwości - pojedyncze mszyce na 20% roślin.



Mączniak rzekomy grochu

Próg szkodliwości - pierwsze objawy.

Ploniarka zbożówka

Próg szkodliwości - 1 larwa na 1 roślinę lub uszkodzenie 15% roślin w roku poprzednim.



BIEŻĄCE INFORMACJE O TYM CO ROBIMY MOŻNA ZNALEŹĆ:

Na kanale YouTube,
zachęcamy do
subskrypcji



Na Facebooku



Na Twitterze



Na naszej stronie
internetowej

<http://podr.pl>

Zachęcamy do odwiedzenia
polskiego e-bazarku

MONIKA MOSTOWSKA
STARSZY SPECJALISTA
DS. OCHRONY ROŚLIN
- KOORDYNATOR
DS. IOR
TEL.: 607 602 731

ZALEŻY NAM NA TWOJEJ OPINII!

- Co myślisz o nowej szacie graficznej?
- Co myślisz o przekazanych informacjach?

Daj nam znać!
KLIKNIJ TU



lub skorzystaj z kodu QR



**Wszystkie prawa
zastrzeżone. Kopiowanie,
przetwarzanie
i rozpowszechnianie bez
zgody PODR
lub autora publikacji jest
zabronione.**