

Newsletter



POMORSKI OŚRODEK
DORADZTWA ROLNICZEGO
W LUBANIU

Sygnalizacja Agrofagów

NR 1/2025



1 Słodyszek rzepakowy

Dorośle chrząszcze zimują w ściółce leśnej, miedzach, pod liśćmi, w zaroślach. Gdy temp. powietrza przekroczy 15°C, a gleby 9°C, chrząszcze wylatują z zimowisk i przemieszczają się na rośliny krzyżowe. Żerują na pyłku i zaczynają uszkadzać pąki kwiatowe. Samice składają jaja do nierozwiniętych pąków kwiatowych.

Opis szkodnika

- Mały chrząszcz o długości 2–2,5 mm.
- Metalicznie zielony, niebieski lub brązowy – charakterystyczny połysk.
- Bardzo ruchliwy, często widoczny na pąkach rzepaku.
- Larwy są białe z ciemną głową, żerują wewnątrz kwiatów.

Szkodliwość

- Chrząszcze wgryzają się w pąki kwiatowe i zjadają organy wewnętrzne (pylniki, znamiona), powodując ich opadanie.
- Larwy żerują na pręcikach i zalążniach, ale szkody są mniejsze niż te spowodowane przez dorosłe osobniki.



Jedna samica może złożyć nawet 100–200 jaj.
Larwy żerują wewnątrz kwiatów (na pręcikach i pylnikach).
Trwa to około 10–14 dni.
Po rozwoju larwy spadają na ziemię, gdzie się przepoczwarzają.

2 Sygnalizacja agrofagów

Aktualna sygnalizacja agrofagów w poszczególnych powiatach województwa pomorskiego ma na celu ułatwienie producentowi rolnemu skuteczne, racjonalne i ekonomiczne zarządzanie ochroną upraw przed agrofagami.

3 Przegląd aktualnych agrofagów

Przegląd aktualnych agrofagów w poszczególnych uprawach ma na celu: wczesne wykrycie zagrożeń, określenie progów szkodliwości, a przede wszystkim optymalizację terminów zabiegów.

**AKTUALNA SYGNALIZACJA WYSTĘPOWANIA AGROFAGÓW
NA DZIEŃ 17 KWIETNIA 2025 r.**

POWIAT	RODZAJ UPRAWY	AGROFAG	PRÓG SZKODLIWOŚCI *
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE			
bytowski	rzepak ozimy BBCH 55	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.
		chowacz podobnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 30	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
chojnicki	rzepak ozimy BBCH 55	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.
		chowacz podobnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	żyto ozime BBCH 30	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
człuchowski	rzepak ozimy BBCH 57	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.
		chowacz podobnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 30	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
gdański	rzepak ozimy BBCH 55	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2

			chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.
		chowacz podobnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 30	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
kartuski	rzepak ozimy BBCH 55	ślodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.
		chowacz podobnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 30	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
kościerski	pszenica ozima BBCH 30	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	żyto ozime BBCH 30	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
kwidzyński	burak cukrowy BBCH 10	pchełka burakowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		śmietka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		szarek komośnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 30	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
lęborski	żyto ozime BBCH 30	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości

malborski	rzepak ozimy BBCH 57	chowacz czterozębny	Nie zaobserwowano
		ślodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.
		chowacz podobnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 29	brunatna plamistość liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - w fazie krzewienia: 10–15% liści z pierwszymi objawami porażeń
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – w fazie krzewienia: 30–50% liści z pierwszymi objawami porażenia
		skrzypionka zbożowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
nowodworski	rzepak ozimy BBCH 55	ślodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.
		chowacz podobnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	groch		
pucki	rzepak ozimy BBCH 57	ślodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie
		chowacz podobnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 30	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
słupski	rzepak ozimy BBCH 55	chowacz czterozębny	Nie zaobserwowano
		ślodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima	brunatna	Nie został przekroczony próg ekonomicznej

	BBCH 31	plamistość liści	szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		skrzypionki	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
starogardzki	kukurydza		
	pszenica ozima BBCH 30	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	ziemniaki		
sztumski	rzepak ozimy BBCH 55	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.
		chowacz podobnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 30	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
tczewski	rzepak ozimy BBCH 55	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 30	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
wejherowski	kukurydza		
	ziemniaki		

Uwaga!!! Decyzję o potrzebie wykonania zabiegu chemicznego podejmuje się indywidualnie dla każdej plantacji, po stwierdzeniu obecności agrofaga i przekroczeniu przez niego progu ekonomicznej szkodliwości.

Komunikat o występowaniu agrofagów służy jako sygnał wskazujący na konieczność dokładnego przeprowadzenia lustracji na plantacji.

Przegląd aktualnych agrofagów

Słodyszek rzepakowy

Próg szkodliwości - zwarty kwiatostan - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.



Chowacz podobnik

Próg szkodliwości - zakończenie kwitnienia (BBCH 69–71) - początek formowania łuszczyń - 1–2 chrząszcze na 1 roślinie

Brunatna plamistość liści

Próg szkodliwości - w fazie krzewienia - 10-15% porażonych roślin z pierwszymi objawami porażenia



Przegląd aktualnych agrofagów

Próg szkodliwości - zwarty
kwiatostan - stwierdzenie
1-2 chrząszczy na 1 roślinie,
luźny kwiatostan - 3-5
chrząszczy na 1 roślinie.



BIEŻĄCE INFORMACJE O TYM CO ROBIMY MOŻNA ZNALEŹĆ:

Na kanale YouTube,
zachęcamy do
subskrypcji



Na Facebooku



Na Twitterze



Na naszej stronie
internetowej

<http://podr.pl>

Zachęcamy do odwiedzenia
polskiego e-bazarku

MONIKA MOSTOWSKA
STARSZY SPECJALISTA
DS. OCHRONY ROŚLIN
- KOORDYNATOR
DS. IOR
TEL.: 607 602 731

ZALEŻY NAM NA TWOJEJ OPINII!

- Co myślisz o nowej szacie graficznej?
- Co myślisz o przekazanych informacjach?

Daj nam znać!
KLIKNIJ TU



lub skorzystaj z kodu QR



Wszystkie prawa
zastrzeżone. Kopiowanie,
przetwarzanie
i rozpowszechnianie bez
zgody PODR
lub autora publikacji jest
zabronione.