

Newsletter



Sygnalizacja Agrofagów

NR 2/2025



1 Oprzędziki

Dorośle chrząszcze zimują w ściółce, na miedzach, rowach i nieużytkach, na brzegach lasów i zagajników. Wiosną (kwiecień, maj) chrząszcze pojawiają się na plantacjach roślin bobowatych. Samice przez okres miesiąca składają jaja na powierzchni gleby w pobliżu roślin żywicielskich w ilości 1000-2000 sztuk. Szczyt składania jaj przypada na przełomie maja i czerwca.

Opis szkodnika

- Chrząszcze długości 5-8 mm. koloru szarobrunatnego z paskami na tułowiu i odwłoku. Ciało ich jest wydłużone, pokryte drobnymi łuseczkami i włoskami. Głowa zakończona grubym, krótkim ryjkiem.
- Larwy są białe, łukowato wygięte, beznogie, z brunatną głową.



Po ok. 2 tygodniach wylęgają się larwy, które wgryzają się do części podziemnych roślin. Po okresie żerowania larwy przepoczwarczają się w glebie. W lipcu pojawiają się chrząszcze nowego pokolenia, które po krótkim żerowaniu szukają miejsc do zimowania.

Szkodliwość

- Chrząszcze żerują na wschodzących roślinach, pozostawiając na krawędziach liści charakterystyczne ząbki (żer zatokowy).
- Larwy żerują w strefie korzeniowej na brodawkach korzeniowych ograniczając wiązanie N atmosferycznego.

2

Sygnalizacja agrofagów

Aktualna sygnalizacja agrofagów w poszczególnych powiatach województwa pomorskiego ma na celu ułatwienie producentowi rolnemu skuteczne, racjonalne i ekonomiczne zarządzanie ochroną upraw przed agrofagami.

3

Przegląd aktualnych agrofagów

Przegląd aktualnych agrofagów w poszczególnych uprawach ma na celu: wczesne wykrycie zagrożeń, określenie progów szkodliwości, a przede wszystkim optymalizację terminów zabiegów.

**AKTUALNA SYGNALIZACJA WYSTĘPOWANIA AGROFAGÓW
NA DZIEŃ 25 KWIETNIA 2025 r.**

POWIAT	RODZAJ UPRAWY	AGROFAG	PRÓG SZKODLIWOŚCI *
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE			
bytowski	rzepak ozimy BBCH 61	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.
		chowacz podobnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 31	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
chojnicki	rzepak ozimy BBCH 61	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.
		chowacz podobnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	żyto ozime BBCH 31	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
człuchowski	rzepak ozimy BBCH 61	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.
		chowacz podobnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 31	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości

gdański	rzepak ozimy BBCH 60	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.
		chowacz podobnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 31	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
kartuski	rzepak ozimy BBCH 55	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.
		chowacz podobnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 30	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
kościerski	pszenica ozima BBCH 31	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	żyto ozime BBCH 31	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
kwidzyński	burak cukrowy BBCH 10	pchełka burakowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		śmietka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		szarek komośnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 31	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości

lęborski	żyto ozime BBCH 30	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
malborski	rzepak ozimy BBCH 62	chowacz czterozębny	Termin zabiegu minął
		słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.
		chowacz podobnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 31	brunatna plamistość liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - w fazie strzelania w źdźbło: 5% liści z pierwszymi objawami porażenia
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – w fazie strzelania w źdźbło: 10–20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami
		skrzypionka zbożowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	groch BBCH 11	oprzędziki	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 10% roślin z uszkodzonymi liśćmi lub 2 chrząszcze na 1 m ²
nowodworski	rzepak ozimy BBCH 63	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie
		chowacz podobnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	groch BBCH	oprzędziki	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 10% roślin z uszkodzonymi liśćmi lub 2 chrząszcze na 1 m ²
pucki	rzepak ozimy BBCH 60	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie
		chowacz podobnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima	brunatna	Nie został przekroczony próg ekonomicznej

	BBCH 31	plamistość liści	szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
słupski	rzepak ozimy BBCH 60	chowacz czterozębny	Termin zabiegu minął
		słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 32	mączniak prawdziwy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - w fazie strzelania w źdźbło - 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		skrzypionki	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
starogardzki	pszenica ozima BBCH 30	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
sztumski	rzepak ozimy BBCH 61	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.
		chowacz podobnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 31	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
tczewski	rzepak ozimy BBCH 61	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - zwarty kwiatostan (BBCH 50/52) - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.
		sucha zgnilizna kapustnych	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 31	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości

wejherowski	kukurydza		
	ziemniak		

Uwaga!!! Decyzję o potrzebie wykonania zabiegu chemicznego podejmuje się indywidualnie dla każdej plantacji, po stwierdzeniu obecności agrofaga i przekroczeniu przez niego progu ekonomicznej szkodliwości.

Komunikat o występowaniu agrofagów służy jako sygnał wskazujący na konieczność dokładnego przeprowadzenia lustracji na plantacji.

Przegląd aktualnych agrofagów

Słodyszek rzepakowy

Próg szkodliwości - zwarty kwiatostan - stwierdzenie 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, luźny kwiatostan - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.



Chowacz podobnik

Próg szkodliwości - zakończenie kwitnienia (BBCH 69–71) - początek formowania łuszczyń - 1–2 chrząszcze na 1 roślinie.

Skrzypionka zbożowa

Próg szkodliwości - w fazie strzelania w źdźbło do fazy kłoszenia - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę. Larwy - 1 larwa na 1 źdźbło.



Przegląd aktualnych agrofagów

Brunatna plamistość liści

Próg szkodliwości - w fazie strzelania w źdźbło - 5% liści z pierwszymi objawami porażenia.



Septorioza paskowana

Próg szkodliwości - w fazie strzelania w źdźbło - 10–20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami.

Oprzędziki

Próg szkodliwości - w grochu - 10% roślin z uszkodzonymi liśćmi lub 2 chrząszcze na 1 m².



BIEŻĄCE INFORMACJE O TYM CO ROBIMY MOŻNA ZNALEŹĆ:

Na kanale YouTube,
zachęcamy do
subskrypcji



Na Facebooku



Na Twitterze



Na naszej stronie
internetowej

<http://podr.pl>



Zachęcamy do odwiedzenia
polskiego e-bazarku

MONIKA MOSTOWSKA
STARSZY SPECJALISTA
DS. OCHRONY ROŚLIN
- KOORDYNATOR
DS. IOR
TEL.: 607 602 731

ZALEŻY NAM NA TWOJEJ OPINII!

- Co myślisz o nowej szacie graficznej?
- Co myślisz o przekazanych informacjach?

Daj nam znać!
KLIKNIJ TU



lub skorzystaj z kodu QR



Wszystkie prawa
zastrzeżone. Kopiowanie,
przetwarzanie
i rozpowszechnianie bez
zgody PODR
lub autora publikacji jest
zabronione.