

Newsletter



POMORSKI OŚRODEK
DORADZTWA ROLNICZEGO
W LUBANIU

Sygnalizacja Agrofagów

NR 4/2025



Objawy żerowania

- Na łuszczynach są obecne nakłucia - małe, punktowe, często ciemniejsze od reszty łuszczyny, zwykle trudne do zauważenia gołym okiem.
- Objawy wtórne żerowania to: zniekształcone, skręcone, nierównomiernie wykształcone łuszczyny. Łuszczyny szybciej dojrzewają, pękają, co prowadzi do osypywania się nasion.


Szkodliwość

- Przy dużym wystąpieniu szkodnika straty plonu mogą sięgnąć nawet 10–30%.
- Osypywanie się nasion przed zbiorem.
- Zwiększenie podatności na choroby: np. szarej pleśni czy suchej zgnilizny.

1

Chowacz podobnik

- Chrząszcze zimują pod ściółką w wierzchniej warstwie gleby.
- Wiosną, gdy temperatura przekracza 15°C, chrząszcze wylatują na plantacje rzepaku. Zwykle pojawiają się w czasie żółtego pąka lub na początku kwitnienia.
- Chrząszcze nakłuwają młode łuszczyny rzepaku, by złożyć w nich jaja. Samica może złożyć kilkadziesiąt do ponad 100 jaj.



- Z jaj wylęgają się larwy, które żerują wewnątrz łuszczyn, wyjadając nasiona. Larwa rozwija się przez około 3–4 tygodnie.
- Po zakończeniu żerowania larwa opuszcza łuszczynę i przepoczwarcza się w glebie.

2

Sygnalizacja agrofagów

Aktualna sygnalizacja agrofagów w poszczególnych powiatach województwa pomorskiego ma na celu ułatwienie producentowi rolnemu skuteczne, racjonalne i ekonomiczne zarządzanie ochroną upraw przed agrofagami.

3

Przegląd aktualnych agrofagów

Przegląd aktualnych agrofagów w poszczególnych uprawach ma na celu: wczesne wykrycie zagrożeń, określenie progów szkodliwości, a przede wszystkim optymalizację terminów zabiegów.

**AKTUALNA SYGNALIZACJA WYSTĘPOWANIA AGROFAGÓW
NA DZIEŃ 9 MAJA 2025 r.**

POWIAT	RODZAJ UPRAWY	AGROFAG	PRÓG SZKODLIWOŚCI *
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE			
bytowski	rzepak ozimy BBCH 67	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - luźny kwiatostan - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1-2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 32	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
chojnicki	rzepak ozimy BBCH 65	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - luźny kwiatostan - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1-2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	żyto ozime BBCH 34	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
człuchowski	rzepak ozimy BBCH 67	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - luźny kwiatostan - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1-2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 33	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
gdański	rzepak ozimy BBCH 67	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - luźny kwiatostan - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1-2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości

	pszenica ozima BBCH 33	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
kartuski	rzepak ozimy BBCH 67	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - luźny kwiatostan - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1-2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 31	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
kościerski	pszenica ozima BBCH 34	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 10–20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia
	żyto ozime BBCH 32	septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia
kwidzyński	burak cukrowy BBCH 14	pchełka burakowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		śmietka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		szarek komośnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 32	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
lęborski	żyto ozime BBCH 31	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	ziemniak	-	
	kukurydza	-	
malborski	rzepak ozimy	słodyszek	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości -

	BBCH 67	rzepakowy	luźny kwiatostan - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		pryszczarek kapustnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 33	brunatna plamistość liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 5% liści z pierwszymi objawami porażenia
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 10–20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami
		skrzypionka zbożowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	groch BBCH 13	oprzędziki	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 10% roślin z uszkodzonymi liśćmi lub 2 chrząszcze na 1 m ²
nowodworski	rzepak ozimy BBCH 67	ślodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - luźny kwiatostan - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	groch BBCH 12	oprzędziki	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 10% roślin z uszkodzonymi liśćmi lub 2 chrząszcze na 1 m ²
pucki	rzepak ozimy BBCH 67	ślodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - luźny kwiatostan - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 32	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
słupski	rzepak ozimy BBCH 65	ślodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - luźny kwiatostan - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 34	mączniak prawdziwy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia
		septorioza	Nie został przekroczony próg ekonomicznej

		paskowana liści	szkodliwości
		skrzypionki	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
starogardzki	kukurydza BBCH 12	ploniarka zbożówka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 33	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	ziemniaki	-	
sztumski	rzepak ozimy BBCH 67	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - luźny kwiatostan - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1-2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 32	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
tczewski	rzepak ozimy BBCH 67	słodyszek rzepakowy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - luźny kwiatostan - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1-2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 32	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
wejherowski	kukurydza		
	ziemniak		

Uwaga!!! Decyzję o potrzebie wykonania zabiegu chemicznego podejmuje się indywidualnie dla każdej plantacji, po stwierdzeniu obecności agrofaga i przekroczeniu przez niego progu ekonomicznej szkodliwości.

Komunikat o występowaniu agrofagów służy jako sygnał wskazujący na konieczność dokładnego przeprowadzenia lustracji na plantacji.

Słodyszek rzepakowy

Próg szkodliwości - luźny kwiatostan - 3-5 chrząszczy na 1 roślinie.



Chowacz podobnik

Próg szkodliwości - zakończenie kwitnienia (BBCH 69–71) - początek formowania łuszczyń - 1–2 chrząszcze na 1 roślinie.

Skrzypionka zbożowa

Próg szkodliwości - w fazie strzelania w źdźbło do fazy kłoszenia - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę. Larwy - 1 larwa na 1 źdźbło.



Przegląd aktualnych agrofagów

Brunatna plamistość liści

Próg szkodliwości - w fazie strzelania w źdźbło - 5% liści z pierwszymi objawami porażenia.



Septorioza

Próg szkodliwości - w fazie strzelania w źdźbło - 10–20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami.

Oprzędziki

Próg szkodliwości - w grochu - 10% roślin z uszkodzonymi liśćmi lub 2 chrząszcze na 1 m².



BIEŻĄCE INFORMACJE O TYM CO ROBIMY MOŻNA ZNALEŹĆ:

Na kanale YouTube,
zachęcamy do
subskrypcji



Na Facebooku



Na Twitterze



Na naszej stronie
internetowej

<http://podr.pl>



Zachęcamy do odwiedzenia
polskiego e-bazarku

MONIKA MOSTOWSKA
STARSZY SPECJALISTA
DS. OCHRONY ROŚLIN
- KOORDYNATOR
DS. IOR
TEL.: 607 602 731

ZALEŻY NAM NA TWOJEJ OPINII!

- Co myślisz o nowej szacie graficznej?
- Co myślisz o przekazanych informacjach?

Daj nam znać!
KLIKNIJ TU



lub skorzystaj z kodu QR



**Wszystkie prawa
zastrzeżone. Kopiowanie,
przetwarzanie
i rozpowszechnianie bez
zgody PODR
lub autora publikacji jest
zabronione.**