

Newsletter

Sygnalizacja Agrofagów NR 5/2025



1

Pchełka burakowa

- Chrzęszcze zimują w glebie, ściółce, pod resztkami roślinnymi, często w pobliżu wcześniejszych upraw buraka.
- Wiosną rozpoczynają żer na chwastach, a potem przenoszą się na młode buraki.
- Samice składają jaja w glebie w pobliżu roślin żywicielskich.
- Larwy żyją w glebie i żerują na korzeniach buraka, ich

Objawy żerowania

- Liczne, małe, okrągłe otwory wygrzyzione w blaszce liściowej.
- Zdeformowane liście, spowolniony wzrost lub zamieranie roślin na skutek uszkodzonych liścieni i młodych liści.
- Nierównomierne wschody i przerzedzenia w przypadku masowego wystąpienia szkodnika.



szkodliwość jest znikoma w porównaniu do formy dorosłej. Po kilku tygodniach larwy przepoczwarczają się w glebie. Młode chrząszcze wychodzą z gleby, żerują przez krótki czas i przygotowują się do zimowania.

Szkodliwość

- Przy masowym występowaniu może dojść do całkowitego zniszczenia blaszki liściowej, co prowadzi do zahamowania wzrostu lub zamierania roślin.
- Uszkodzenia liści ograniczają powierzchnię fotosyntezy, co wpływa na zmniejszenie tempa wzrostu roślin.

2

Sygnalizacja agrofagów

Aktualna sygnalizacja agrofagów w poszczególnych powiatach województwa pomorskiego ma na celu ułatwienie producentowi rolnemu skuteczne, racjonalne i ekonomiczne zarządzanie ochroną upraw przed agrofagami.

3

Przegląd aktualnych agrofagów

Przegląd aktualnych agrofagów w poszczególnych uprawach ma na celu: wczesne wykrycie zagrożeń, określenie progów szkodliwości, a przede wszystkim optymalizację terminów zabiegów.

**AKTUALNA SYGNALIZACJA WYSTĘPOWANIA AGROFAGÓW
NA DZIEŃ 16 MAJA 2025 r.**

POWIAT	RODZAJ UPRAWY	AGROFAG	PRÓG SZKODLIWOŚCI *
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE			
bytowski	rzepak ozimy BBCH 67	ślodyszek rzepakowy	Termin zabiegu minął
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 32	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
chojnicki	rzepak ozimy BBCH 65	ślodyszek rzepakowy	Termin zabiegu minął
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	żyto ozime BBCH 34	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
człuchowski	rzepak ozimy BBCH 67	ślodyszek rzepakowy	Termin zabiegu minął
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 33	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
gdański	rzepak ozimy BBCH 67	ślodyszek rzepakowy	Termin zabiegu minął
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima	mączniak	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości

	BBCH 33	prawdziwy zbóż i traw	szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
kartuski	rzepak ozimy BBCH 67	słodyszek rzepakowy	Termin zabiegu minął
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 31	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
kościerski	pszenica ozima BBCH 34	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 10–20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia
	żyto ozime BBCH 32	septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia
kwidzyński	burak cukrowy BBCH 14	pchełka burakowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		śmietka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		szarek konośnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 33	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
lęborski	żyto ozime BBCH 32	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	ziemniak	-	
	kukurydza	-	
malborski	rzepak ozimy	słodyszek rzepakowy	Termin zabiegu minął

	BBCH 67	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		pryszczarek kapustnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 33	brunatna plamistość liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 5% liści z pierwszymi objawami porażenia
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 10–20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami
		skrzypionka zbożowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	groch BBCH 15	oprzędziki	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 10% roślin z uszkodzonymi liśćmi lub 2 chrząszcze na 1 m ²
nowodworski	rzepak ozimy BBCH 67	słodyszek rzepakowy	Termin zabiegu minął
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	groch BBCH 14	oprzędziki	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 10% roślin z uszkodzonymi liśćmi lub 2 chrząszcze na 1 m ²
pucki	rzepak ozimy BBCH 67	słodyszek rzepakowy	Termin zabiegu minął
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 33	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
słupski	rzepak ozimy BBCH 65	słodyszek rzepakowy	Termin zabiegu minął
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 35	mączniak prawdziwy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		skrzypionki	Nie został przekroczony próg ekonomicznej

	jęczmień ozimy BBCH 37		szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		skrzypionki	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
starogardzki	kukurydza BBCH 12	ploniarka zbożówka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 33	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	ziemniaki	-	
sztumski	rzepak ozimy BBCH 67	słodyszek rzepakowy	Termin zabiegu minął
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 33	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
tczewski	rzepak ozimy BBCH 67	słodyszek rzepakowy	Termin zabiegu minął
		chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 33	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
wejherowski	kukurydza		
	ziemniak		

Uwaga!!! Decyzję o potrzebie wykonania zabiegu chemicznego podejmuje się indywidualnie dla każdej plantacji, po stwierdzeniu obecności agrofaga i przekroczeniu przez niego progu ekonomicznej szkodliwości.

Komunikat o występowaniu agrofagów służy jako sygnał wskazujący na konieczność dokładnego przeprowadzenia lustracji na plantacji.

Przegląd aktualnych agrofagów

Pchełka burakowa

Próg szkodliwości - do fazy
4 liści - 5-10 chrząszczy na
1 roślinie.



Chowacz podobnik

Próg szkodliwości -
zakończenie kwitnienia
(BBCH 69-71) - początek
formowania łuszczyń - 1-2
chrząszcze na 1 roślinie.

Skrzypionki

Próg szkodliwości - w fazie
strzelania w źdźbło do fazy
kłoszenia - 1-2 chrząszcze na
1 roślinę. Larwy - 1 larwa na 1
źdźbło.



Oprzędziki

Próg szkodliwości - w
grochu, bobiku - 10% roślin
z uszkodzonymi liśćmi lub
2 chrząszcze na 1 m².



Septorioza

Próg szkodliwości - w fazie
strzelania w źdźbło - 10–
20% porażonej powierzchni
liścia podflagowego lub 1%
liści z owocnikami.

Brunatna plamistość liści

Próg szkodliwości - w fazie
strzelania w źdźbło - 5% liści
z pierwszymi objawami
porażenia.



BIEŻĄCE INFORMACJE O TYM CO ROBIMY MOŻNA ZNALEŹĆ:

Na kanale YouTube,
zachęcamy do
subskrypcji



Na Facebooku



Na Twitterze



Na naszej stronie
internetowej

<http://podr.pl>



Zachęcamy do odwiedzenia
polskiego e-bazarku

MONIKA MOSTOWSKA
STARSZY SPECJALISTA
DS. OCHRONY ROŚLIN
- KOORDYNATOR
DS. IOR
TEL.: 607 602 731

ZALEŻY NAM NA TWOJEJ OPINII!

- Co myślisz o nowej szacie graficznej?
- Co myślisz o przekazanych informacjach?

Daj nam znać!
KLIKNIJ TU



lub skorzystaj z kodu QR



Wszystkie prawa
zastrzeżone. Kopiowanie,
przetwarzanie
i rozpowszechnianie bez
zgody PODR
lub autora publikacji jest
zabronione.