

Newsletter



Sygnalizacja Agrofagów

NR 7/2025




1 Septorioza plew pszenicy

- Grzyb zimuje w formie piknidiów w resztkach poźniwnych oraz w mniejszym stopniu w postaci pseudotecji i grzybni.
- Wiosną piknidia uwalniają zarodniki konidialne, które są rozprzestrzeniane przez deszcz. Zarodniki kiełkują na roślinach, infekując liście i plewy. W porażonych tkankach tworzą się piknidia, w których powstają nowe zarodniki konidialne.

Objawy porażenia

- Plamy mają początkowo żółtozieloną barwę, następnie brązowieją i przybierają kształt soczewkowaty. Starsze plamy są jasnobrązowe i zlewają się. Na powierzchni plam mogą pojawiać się słabo widoczne piknidia.
- Po wykłoszeniu pszenicy na plewkach pojawiają się czarnobrunatne z odcieniem fioleto nekrotyczne plamki.



- Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi patogena są: utrzymywanie się wilgoci na liściach przez 3-6 godzin oraz temperatura 20-24°C. W korzystnych warunkach rozwój choroby następuje po 7-14 dniach inkubacji grzyba.

Szkodliwość

- Straty plonów mogą sięgać 10-30%.
- Pogorszenie jakości ziarna.
- Porażone ziarno jest mniejsze, słabo wykształcone.
- Zwiększone ryzyko wtórnych infekcji.
- Największe szkody powoduje w fazie kłoszenia i kwitnienia.

2 Sygnalizacja agrofagów

Aktualna sygnalizacja agrofagów w poszczególnych powiatach województwa pomorskiego ma na celu ułatwienie producentowi rolnemu skuteczne, racjonalne i ekonomiczne zarządzanie ochroną upraw przed agrofagami.

3 Przegląd aktualnych agrofagów

Przegląd aktualnych agrofagów w poszczególnych uprawach ma na celu: wczesne wykrycie zagrożeń, określenie progów szkodliwości, a przede wszystkim optymalizację terminów zabiegów.

**AKTUALNA SYGNALIZACJA WYSTĘPOWANIA AGROFAGÓW
NA DZIEŃ 30 MAJA 2025 r.**

POWIAT	RODZAJ UPRAWY	AGROFAG	PRÓG SZKODLIWOŚCI *
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE			
bytowski	rzepak ozimy BBCH 69	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 34	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
chojnicki	rzepak ozimy BBCH 69	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	żyto ozime BBCH 34	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
człuchowski	rzepak ozimy BBCH 69	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 34	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
gdański	rzepak ozimy BBCH 69	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 34	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości

kartuski	rzepak ozimy BBCH 69	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 33	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	kukurydza BBCH 11	ploniarka zbożówka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyca	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
kościerski	pszenica ozima BBCH 37	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	żyto ozime BBCH 59	septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	łubin BBCH 16	oprzędziki	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	groch BBCH 16	oprzędziki	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	ziemniaki BBCH 14	mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		stonka ziemniaczana	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
kwidzyński	burak cukrowy BBCH 17	pchełka burakowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		śmietka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		szarek komośnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 37	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	kukurydza BBCH 13	ploniarka zbożówka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości

		mszyca	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
łęborski	żyto ozime BBCH 51	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	ziemniaki BBCH 9	mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		stonka ziemniaczana	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	kukurydza BBCH 11	ploniarka zbożówka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
malborski	rzepak ozimy BBCH 69	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		pryszczarek kapustnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 34	brunatna plamistość liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 5% liści z pierwszymi objawami porażenia
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza plew pszenicy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – w fazie strzelania w źdźbło 20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami
		skrzypionka zbożowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	groch BBCH 39	mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		askochytoza grochu	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – pierwsze objawy porażenia
	burak cukrowy BBCH 17	mszyca trzmielinowo-burakowa	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - występowanie średnio 15 mszyc nieuskrzydłych na jedną roślinę, lub stwierdzenie powyżej 15% zasiedlonych roślin na plantacji
	kukurydza BBCH 14	ploniarka zbożówka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
nowodworski	rzepak ozimy BBCH 69	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	groch BBCH 36	oprzędziki	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej

			szkodliwości
pucki	rzepak ozimy BBCH 69	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 34	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
słupski	rzepak ozimy BBCH 69	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 37	mączniak prawdziwy	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		brunatna plamistość liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 5% liści z pierwszymi objawami porażenia
		skrzypionki	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	jęczmień ozimy BBCH 55	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		skrzypionki	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
starogardzki	kukurydza BBCH 13	ploniarka zbożówka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 51	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	ziemniaki BBCH 5	mszyce	-
sztumski	rzepak ozimy BBCH 69	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 34	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza	Nie został przekroczony próg ekonomicznej

		paskowana liści	szkodliwości
tczewski	rzepak ozimy BBCH 69	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 34	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
wejherowski	kukurydza BBCH 11	ploniarka zbożówka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	ziemniaki	mszyce	-


Uwaga!!! Decyzję o potrzebie wykonania zabiegu chemicznego podejmuje się indywidualnie dla każdej plantacji, po stwierdzeniu obecności agrofaga i przekroczeniu przez niego progu ekonomicznej szkodliwości.

Komunikat o występowaniu agrofagów służy jako sygnał wskazujący na konieczność dokładnego przeprowadzenia lustracji na plantacji.

Przegląd aktualnych agrofagów

Śmietki

Próg szkodliwości - fazy 4 liści -
8 jaj lub min na 1 roślinę, faza 6
liści - 20 jaj lub min na 1 roślinę.



Mszycy trzmielinowo burakowa

Próg szkodliwości - 15%
zasiedlonych roślin lub średnio
15 mszyc nieuskrzydłych na
jedną roślinę.

Chowacz podobnik

Próg szkodliwości -
zakończenie kwitnienia (BBCH
69-71) - początek formowania
łuszczyń - 1-2 chrząszcze na 1
roślinie.



Przegląd aktualnych agrofagów

Skrzypionki

Próg szkodliwości - w fazie strzelania w źdźbło do fazy kłoszenia - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę. Larwy - 1 larwa na 1 źdźbło.



Septorioza

Próg szkodliwości - w fazie strzelania w źdźbło 20% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami, w fazie początku kłoszenia 10% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami

Brunatna plamistość liści

Próg szkodliwości - w fazie strzelania w źdźbło - 5% liści z pierwszymi objawami porażenia.



BIEŻĄCE INFORMACJE O TYM CO ROBIMY MOŻNA ZNALEŹĆ:

Na kanale YouTube,
zachęcamy do
subskrypcji



Na Facebooku



Na Twitterze



Na naszej stronie
internetowej

<http://podr.pl>



Zachęcamy do odwiedzenia
polskiego e-bazarku

MONIKA MOSTOWSKA
STARSZY SPECJALISTA
DS. OCHRONY ROŚLIN
- KOORDYNATOR
DS. IOR
TEL.: 607 602 731

ZALEŻY NAM NA TWOJEJ OPINII!

- Co myślisz o nowej szacie graficznej?
- Co myślisz o przekazanych informacjach?

Daj nam znać!
KLIKNIJ TU



lub skorzystaj z kodu QR



Wszystkie prawa
zastrzeżone. Kopiowanie,
przetwarzanie
i rozpowszechnianie bez
zgody PODR
lub autora publikacji jest
zabronione.