

Newsletter

Sygnalizacja Agrofagów

NR 8/2025



Objawy żerowania

- Na zasiedlonych roślinach występują jasnozielone mszyce na spodniej stronie liści, młodych pędach, ogonkach liściowych, strąkach.
- Do objawów żerowania należą: deformacja liści i pędów, zahamowanie wzrostu roślin, przedwczesne żółknięcie i zasychanie roślin, a także obecność spadzi.

Szkodliwość

- Silne żerowanie mszyc może prowadzić do spadku plonów, nawet o 30–50%.
- Strąki są drobniejsze, słabo wypełnione i zniekształcone.
- Mszyce mogą przenosić wirusy, m.in.: żółtaczkę grochu, żółtej mozaiki fasoli, czy żółtej mozaiki lucerny.

1 Mszyca grochowa

- Mszyce zimuje w stadium jaja na wieloletnich roślinach bobowatych. Wczesną wiosną wylęgają się larwy żerujące na młodych liściach roślin wieloletnich.
- Pod koniec maja pojawiają się formy uskrzydłone, które migrują na plantacje roślin żywicielskich. Mszyce te w ciągu lata wydają żyworośnie 4–6 pokoleń bezskrzydłych.
- Pod koniec wegetacji roślin, pojawiają się na nich formy



- uskrzydłone, które przenoszą się na wieloletnie rośliny bobowate, gdzie rodzą samce i samice, które po kopulacji składają zapłodnione jaja
- Licznemu występowaniu mszyc sprzyja ciepła, umiarkowanie wilgotna pogoda.

2 Sygnalizacja agrofagów

Aktualna sygnalizacja agrofagów w poszczególnych powiatach województwa pomorskiego ma na celu ułatwienie producentowi rolnemu skuteczne, racjonalne i ekonomiczne zarządzanie ochroną upraw przed agrofagami.

3 Przegląd aktualnych agrofagów

Przegląd aktualnych agrofagów w poszczególnych uprawach ma na celu: wczesne wykrycie zagrożeń, określenie progów szkodliwości, a przede wszystkim optymalizację terminów zabiegów.

**AKTUALNA SYGNALIZACJA WYSTĘPOWANIA AGROFAGÓW
NA DZIEŃ 6 CZERWCA 2025 r.**

POWIAT	RODZAJ UPRAWY	AGROFAG	PRÓG SZKODLIWOŚCI *
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE			
bytowski	rzepak ozimy BBCH 71	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
	pszenica ozima BBCH 45	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - faza kłoszenia - 5-10% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści z owocnikami
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
chojnicki	rzepak ozimy BBCH 73	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	żyto ozime BBCH 52	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - faza kłoszenia - 5-10% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści z owocnikami
człuchowski	rzepak ozimy BBCH 73	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 45	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - faza kłoszenia - 5-10% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści z owocnikami
gdański	rzepak ozimy BBCH 73	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 47	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - faza kłoszenia - 5-10% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści z owocnikami
		brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości

kartuski	rzepak ozimy BBCH 71	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 43	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - faza kłosa - 5-10% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści z owocnikami
	kukurydza BBCH 14	ploniarka zbożówka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyca	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
kościerski	pszenica ozima BBCH 51	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - faza kłosa - 5-10% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści z owocnikami
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	żyto ozime BBCH 61	septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	łubin BBCH 16	oprzędziki	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	groch BBCH 16	oprzędziki	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	ziemniaki BBCH 14	mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		stonka ziemniaczana	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
kwidzyński	burak cukrowy BBCH 19	pchełka burakowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		śmietka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		szarek kmośnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 57	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - faza kłosa - 5-10% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści z owocnikami

	kukurydza BBCH 15	ploniarka zbożówka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyca	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
łęborski	żyto ozime BBCH 51	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	ziemniaki BBCH 14	mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		stonka ziemniaczana	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	kukurydza BBCH 13	ploniarka zbożówka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
malborski	rzepak ozimy BBCH 72	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1– 2 chrząszcze na 1 roślinę
		pryszczarek kapustnik	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 45	brunatna plamistość liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 5% liści z pierwszymi objawami porażenia
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - faza kłoszenia - 5-10% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści z owocnikami
		septorioza plew pszenicy	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 10% porażonej powierzchni liścia podflagowego lub 1% liści z owocnikami
		skrzypionka zbożowa	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – 1–2 chrząszcze na 1 roślinę lub 1 larwa na 1 źdźbło
	groch BBCH 39	mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		askochytoza grochu	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości – pierwsze objawy porażenia
	burak cukrowy BBCH 19	mszyca trzmielinowo- burakowa	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - występowanie średnio 15 mszyc nieuskrzydłych na jedną roślinę, lub stwierdzenie powyżej 15% zasiedlonych roślin na plantacji
	kukurydza BBCH 15	ploniarka zbożówka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	ziemniaki BBCH 16	stonka ziemniaczana	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 10 złóż jaj na 10 roślin lub 15 larw na 1 roślinę, lub 1-2 chrząszczy na 25 roślin
		mszyca	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
nowodworski	rzepak ozimy BBCH 73	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1– 2 chrząszcze na 1 roślinę

	groch BBCH 39	zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		oprzędziki	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
pucki	rzepak ozimy BBCH 72	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1– 2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 45	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - faza kłoszenia - 5-10% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści z owocnikami
słupski	rzepak ozimy BBCH 72	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1– 2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 51	mączniak prawdziwy	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - faza kłoszenia - 5-10% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści z owocnikami
		brunatna plamistość liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 5% liści z pierwszymi objawami porażenia
		skrzypionki	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	jęczmień ozimy BBCH 58	mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		skrzypionki	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
starogardzki	kukurydza BBCH 14	ploniarka zbożówka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 59	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		mączniak prawdziwy zbóż i traw	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - faza kłoszenia - 5-10% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści z owocnikami
	ziemniaki	mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej

	BBCH 11		szkodliwości
sztumski	rzepak ozimy BBCH 73	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 45	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - faza kłoseń - 5-10% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści z owocnikami
tczewski	rzepak ozimy BBCH 72	chowacz podobnik	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - 1–2 chrząszcze na 1 roślinę
		zgnilizna twardzikowa	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	pszenica ozima BBCH 45	brunatna plamistość liści	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
		septorioza paskowana liści	Przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości - faza kłoseń - 5-10% porażonej powierzchni liścia flagowego lub 1% liści z owocnikami
wejherowski	kukurydza BBCH 13	ploniarka zbożówka	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości
	ziemniaki BBCH 14	mszyce	Nie został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości

Uwaga!!! Decyzję o potrzebie wykonania zabiegu chemicznego podejmuje się indywidualnie dla każdej plantacji, po stwierdzeniu obecności agrofaga i przekroczeniu przez niego progu ekonomicznej szkodliwości.

Komunikat o występowaniu agrofagów służy jako sygnał wskazujący na konieczność dokładnego przeprowadzenia lustracji na plantacji.

Przegląd aktualnych agrofagów

Śmietki na buraku cukrowym

Próg szkodliwości - do fazy 8 liści - powyżej 20 jaj lub min na 1 roślinę.



Mszycy trzmielinowo burakowa

Próg szkodliwości - 15% zasiedlonych roślin lub średnio 15 mszyc nieuskrzydłych na jedną roślinę.

Mszyce na ziemniaku

Próg szkodliwości - plantacje nasienne - 5-10 mszyc/100 liści, plantacje produkcyjne - 10-20 mszyc/100 liści, szkodnik bezpośredni - 500 mszyc/100 liści.



Przegląd aktualnych agrofagów

Skrzypionki

Próg szkodliwości - do fazy kłoszenia - 1-2 chrząszcze na 1 roślinę. Larwy - 1 larwa na 1 źdźbło.



Septorioza plew pszenicy

Próg szkodliwości - w fazie kłoszenia - 5-10% liści z objawami porażenia

Brunatna plamistość liści

Próg szkodliwości - w fazie strzelania w źdźbło - 5% liści z pierwszymi objawami porażenia.



BIEŻĄCE INFORMACJE O TYM CO ROBIMY MOŻNA ZNALEŹĆ:

Na kanale YouTube,
zachęcamy do
subskrypcji



Na Facebooku



Na Twitterze



Na naszej stronie
internetowej

<http://podr.pl>



Zachęcamy do odwiedzenia
polskiego e-bazarku

MONIKA MOSTOWSKA
STARSZY SPECJALISTA
DS. OCHRONY ROŚLIN
- KOORDYNATOR
DS. IOR
TEL.: 607 602 731

ZALEŻY NAM NA TWOJEJ OPINII!

- Co myślisz o nowej szacie graficznej?
- Co myślisz o przekazanych informacjach?

Daj nam znać!
KLIKNIJ TU



lub skorzystaj z kodu QR



Wszystkie prawa
zastrzeżone. Kopiowanie,
przetwarzanie
i rozpowszechnianie bez
zgody PODR
lub autora publikacji jest
zabronione.